

Käyttöohje^{*} Caphosol[®]-suuvesi 30 poretablettia

- 4-10 kertaa päivässä.
- Käytä liuosta koko hoidon ajan tai lääkärin ohjeiden mukaan.



1. Laita yksi poretabletti ja 50 ml vettä lasiin.



2. Odota, että tabletti on täysin liuennut. Käytä liuos välittömästi sekoittamisen jälkeen.



3. Ota puolet lasin sisällöstä suuhusi. Älä niele.



4. Purskuttele Caphosol-liuosta suussasi 1 minuutin ajan.



5. Sylje liuos pois.
Toista sama lopulla Caphosol-liuoksella.

Voit lisätä käyttökertoja aina 10 kertaan vuorokaudessa, jos koet, ettei hoito pienemmällä määrällä tehoa riittävästi.

 **Caphosol[®]**
DISPERSIBLE

Tuoteseloste

Yksi pakkaus sisältää 30 poretablettia. **Valmistemuoto:** Suuvesi. Poretabletin liuetessa syntyy vesiliuos. Caphosol Dispensible on ylikyllästetty liuos, jossa on sekä kalsium- että fosfaatti-ioneja. **Valmistusaineet:** Dinatriumfosfaatti 0,032, Natriumdivetyfosfaatti 0,009, Kalsiumkloridi 0,052 (% w/w). **Apuaineet:** maltodekstriini, natriumvetykarbonaatti, natriumkarbonaatti, sitruunahappo, sorbitoli. **Käyttö:** Caphosol Dispensible -poretablettista liotetaan vedessä elektrolyyttiliuos, joka kosteuttaa, voitelee ja puhdistaa suuonteloa, limakalvoja, kieltä ja nielua. **Käyttötarkoitus:** Caphosol Dispensible on tarkoitettu suun ja nielun pitkä- ja lyhytaikaisen kuivuuden hoitamiseen (hyposalivaatio, kserostomia), oireen syyistä ja kestosta riippumatta. Caphosol Dispensible-poretablettia voidaan käyttää myös sädehoidon tai korkea-annoksisen solunsalpaajahoidon yhteydessä ilmenevän mukositiitin hoitamiseen. Limakalvojen kuivuuden vähenemisen on todettu helpottavan kipua.

Käyttöohjeet:

- Laita yksi poretabletti ja 50 ml vettä lasiin ja odota, että tabletti on täysin liennut. Voit käyttää normaalia hanavettä, jos se on pehmeää tai keskikovaa, mutta käytä mieluummin pullovetä. Sairaalaoloissa suositellaan käytettävän puhdistettua vettä.
- Purskuttele puolet liuoksesta suussa yhden minuutin ajan ja sylje se pois.
- Toista sama loppuliuksen kanssa ja sylje se pois.
- Liuos on käytettävä heti sen valmistuttua.

Annostus:

Käyttö korkea-annoksisen solunsalpaajahoidon tai sädehoidon aikana: 4 annosta päivässä syöpähoidon aloittamisesta alkaen. Annostusta voidaan nostaa aina 10 annokseen päivässä, mikäli oireet ja mukositiista aiheutuva kipu jatkuvat. Käytä hoitojen ajan tai lääkärin ohjeen mukaan.

Kuivan suun oireiden helpottamiseen: Suositeltu aloitusannos on 4 kertaa päivässä. Annostusta voidaan nostaa aina 10 annokseen päivässä, mikäli oireet jatkuvat tai lääkäri ohjeistaa annostuksen.

Vaikutus muiden hoitojen kanssa: Ei tunnettuja vaikutuksia käytettäessä muiden lääkkeiden tai tuotteiden kanssa. **Varoitimet tuotetta käytettäessä:** Vältä syömistä ja juomista käytön jälkeen vähintään 15 minuutin ajan. Pidä pakkaus hyvin suljettuna. Älä käytä tuotetta, mikäli pakkaus on rikki. Sisältää natriumia (1 g per 50 ml). Vähäsuolaista ruokavaliota noudattavien potilaiden on keskusteltava käytöstä lääkärin kanssa. Ei lasten ulottuville. Ei saa pakastaa. Caphosol Dispensible -poretabletin käytöstä ei aiheudu haittavaikutuksia, jos sitä niellään vahingossa.

Lisätietoja:

Oy Swedish Orphan Biovitrum Ab (SOBI)
puh. 0201 558 840
www.sobi.fi

