


Käyttöohje



4-10 kertaa päivässä.

Käytä liuosta koko hoidon ajan tai lääkärin ohjeiden mukaan.



1. Caphosol on pakattu kahteen erilliseen kerta-annospakkaukseen: Caphosol A ja Caphosol B. Ota 1 A ja 1 B kerta-annos.
2. Poista korkki kummastakin pakkauksesta ja tyhjennä ne samaan juomalasiin.
3. Sekoita juomalasin sisältö ja käytä se välittömästi sekoittamisen jälkeen.
4. Ota puolet lasin sisällöstä suuhusi. Älä niele.
5. Pursuttele Caphosol-liuosta suussasi 1 minuutin ajan.
6. Sylje liuos pois.
Toista sama lopulla Caphosol-liuoksella.
Voit lisätä käyttökertoja aina 10 kertaan vuorokaudessa, jos koet, ettei hoito pienemmällä määrällä tehoa riittävästi.



sobi

Pioneer in Rare Diseases

www.sobi.fi

005CAP-FI-2014

Tuoteseloste

1 pakkaus sisältää 4x30 hoitoannosta, 1 hoitoannos = 2 kerta-annospakkausta, joista kumpikin sisältää 15 ml, sekoitettuna keskenään.


Valmistemuoto: Suuvesi. Vesiliuos. Caphosol on valmiste, joka koostuu kahdesta erikseen pakatusta vesiliuoksesta, fosfaattiliuoksesta (Caphosol A) ja kalsiumliuoksesta (Caphosol B). Kun yhtä suuri määrä kumpaakin liuosta sekoitetaan keskenään, muodostuu sekä kalsium- että fosfaatti-ionien suhteen ylikyllästynyt liuos.

Sisältö: Kaksiemäksinen natriumfosfaatti 0,032, yksiemäksinen natriumfosfaatti 0.009, kalsiumkloridi 0.052, natriumkloridi 0.569, puhdistettu vesi q.s. (%w/w).

Vaikutukset: Caphosol on elektrolyyttiliuos, joka on tarkoitettu suuontelon (mukaan lukien suun, kielen, ja suunielun limakalvot) kostutukseen, voiteluun ja puhdistukseen.

Käyttöaiheet: Caphosol-suuveden käyttöaiheita ovat suun ja suunielun kuivuus (hyposalivaatio, kserostomia, riippumatta syystä ja siitä, onko tila tilapäinen vai pysyvä). Caphosol on myös indisoitu käytettäväksi normaalin suuhoidon lisänä sädehoidon tai korkea-annoksisen solunsalpaajahoidon mahdollisesti aiheuttaman limakalvotulehduksen ehkäisyyn ja hoitoon. Näissä tiloissa suun limakalvojen kuivuuden lievitys liittyy kipuoireiden lievenemiseen.

Käyttöohjeet:

- A**  **B**
1. Sekoita 1 Caphosol A kerta-annospakkaus ja 1 Caphosol B kerta-annospakkaus puhtaassa juomalasissa.
 2. Pursuttele 1/2, liuoksesta suussa 1 minuutin ajan ja sylje pois.
 3. Toista purskuttelu jäljellä olevalla puolikkaalla liuosannoksella ja sylje pois.

Käytä liuos välittömästi kerta-annoksen sekoittamisen jälkeen.

Annostus: 4-10 kertaa päivässä. Käytä liuosta koko hoidon ajan tai lääkärin ohjeiden mukaan.

Yhteisvaikutukset muiden hoitotapojen kanssa: Ei ole tunnettuja yhteisvaikutuksia lääkkeiden tai muiden valmisteiden kanssa.

Käyttöön liittyvät varoitimet: Vältä syömästä ja juomasta ainakin 15 minuutin ajan purskuttelun jälkeen. Älä käytä liuosta, jos kerta-annospakkauksen sinetti on rikki tai jos kerta-annospakkauksessa näkyy merkkejä vuodosta tai vaurioista. Sisältää natriumia (71 mg/ 30 ml hoitoannos). Vähänatriumista ruokavaliota noudattavien potilaiden tulee kysyä neuvoa lääkäritään ennen valmisteen käyttöä. Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Ei saa jäätyä.

Caphosolin vahingossa nielemisestä ei oleteta olevan haitallisia vaikutuksia.

CE  EUSA Pharma

 **Caphosol**
Ylikyllästetty kalsiumfosfaattiliuos